

ĐỀ THI HỌC KÌ II CHƯƠNG TRÌNH MỚI – ĐỀ SỐ 6

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

**Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì II của chương trình sách giáo khoa Vật lý – Kết nối tri thức.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Vật lý
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dần trải tất cả các chương của học kì II – chương trình Vật lý

Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g . Phát biểu nào sau đây sai.

- A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức $P = mg$.
- B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
- C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
- D. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

Câu 2: Một xe tải có khối lượng 3 tấn đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang, hệ số ma sát của xe tải với mặt đường là 0,1. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ lớn của lực ma sát là

- A. 3000 N. B. 30000 N. C. 300 N. D. 30 N

Câu 3: Chọn câu đúng. Lực ma sát phụ thuộc vào

- A. trạng thái bề mặt và diện tích mặt tiếp xúc.
- B. diện tích bề mặt tiếp xúc và vật liệu.
- C. vật liệu và trạng thái bề mặt tiếp xúc.
- D. trạng thái bề mặt tiếp xúc, diện tích mặt tiếp xúc và vật liệu

Câu 4: Đặt một vật dạng hộp có khối lượng 50 kg trên mặt phẳng nghiêng ta thấy vật đứng yên. Mặt phẳng nghiêng dài $l=4 \text{ m}$ và cao $h=1 \text{ m}$. Lấy $g=10 \text{ m/s}^2$. Lực ma sát nghỉ có độ lớn là

- A. 500 N B. 125 N C. 484 N D. 200 N

Câu 5: Một đầu tàu có khối lượng 40 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 10 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc $a = 0,5 \text{ m/s}^2$. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với

đường ray là 0,03. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực phát động F tác dụng lên đoàn tàu và lực căng T ở chỗ nối giữa 2 toa là

- A. $F = 36000 \text{ N}$; $T = 8000 \text{ N}$ B. $F = 48000 \text{ N}$; $T = 8000 \text{ N}$
 C. $F = 48000 \text{ N}$; $T = 28000 \text{ N}$ D. $F = 36000 \text{ N}$; $T = 28000 \text{ N}$

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là **không** chính xác?

- A. Đơn vị của mômen là N.m
 B. Ngẫu lực không có hợp lực
 C. Lực gây ra tác dụng làm quay khi giá của nó không đi qua trọng tâm
 D. Ngẫu lực gồm 2 lực song song, ngược chiều, khác giá, cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật

Câu 7: Một ngẫu lực gồm hai lực F_1 và F_2 có $F_1 = F_2 = F$ và có cánh tay đòn của mỗi lực là d . Mômen của ngẫu lực này là:

- A. $(F_1 - F_2)d$. B. $2Fd$.
 C. Fd . D. Chưa biết được vì còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay

Câu 8: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

- A. tác dụng kéo của lực. B. tác dụng làm quay của lực.
 C. tác dụng uốn của lực. D. tác dụng nén của lực


Câu 9: Đại lượng nào sau đây **không phải** là một dạng năng lượng?

- A. Cơ năng. B. Hóa năng. C. Nhiệt năng. D. Nhiệt lượng

Câu 10: Năng lượng phát ra từ Mặt Trời có nguồn gốc là

- A. năng lượng hóa học. B. năng lượng nhiệt.
 C. năng lượng hạt nhân. D. quang năng

Câu 11: Một lực F có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật đang chuyển động với vận tốc v theo các phương khác nhau như Hình 23.1 Độ lớn của công do lực F thực hiện xếp theo thứ tự tăng dần là



Hình 23.1

- A. (a, b, c). B. (a, c, b). C. (b, a, c). D. (c, a, b)

Câu 12: Trong ô tô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng, tải trọng lớn thì người lái sẽ

- A. giảm vận tốc đi số nhỏ. B. giảm vận tốc đi số lớn.
C. tăng vận tốc đi số nhỏ. D. tăng vận tốc đi số lớn.

Câu 13: Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng:

- A. 7200 J. B. 200 J. C. 200 kJ. D. 72 kJ.

Câu 14: Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là

- A. 1s. B. 10s C. 100s. D. 1000s.

Câu 15: Công mà một lực có thể thực hiện lên một vật bằng:

- A. Độ biến thiên động năng của vật. B. Độ biến thiên động lượng của vật.
C. Độ biến thiên vận tốc của vật. D. A và B đúng.

Câu 16: Khi con lắc đồng hồ dao động thì

- A. cơ năng của nó bằng không.
B. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của lực căng dây treo.
C. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của trọng lực.
D. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của lực ma sát.

Câu 17: Một vật nhỏ có khối lượng $1,5\text{kg}$ trượt nhanh dần đều xuống một đường dốc thẳng, nhẵn. Tại một thời điểm xác định vật có vận tốc 3m/s , sau đó 4s có vận tốc 7m/s , tiếp ngay sau đó 3s vật có động lượng là

- A. $15\text{kg}\cdot\text{m/s}$ B. $7\text{kg}\cdot\text{m/s}$. C. $12\text{kg}\cdot\text{m/s}$. D. $21\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

Câu 18: Một quả bóng khối lượng $0,5\text{kg}$ đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động với vận tốc 40m/s . Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng

- A. $80\text{N}\cdot\text{s}$. B. $8\text{N}\cdot\text{s}$. C. $20\text{N}\cdot\text{s}$. D. $45\text{N}\cdot\text{s}$.

Câu 19: Một vật khối lượng 500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tốc độ 12m/s . Động lượng của vật có giá trị là

- A. $6\text{kg}\cdot\text{m/s}$. B. $-3\text{kg}\cdot\text{m/s}$. C. $-6\text{kg}\cdot\text{m/s}$. D. $3\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

Câu 20: Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?

- A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh.
- B. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân.
- C. Chuyển động quay của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều.
- D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.

Câu 21: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái Đất. Lấy gia tốc rơi tự do tại mặt đất là $g = 10m/s^2$ và bán kính của Trái Đất bằng $R = 6\ 400\text{ km}$. Chu kì quay quanh Trái Đất của vệ tinh là

- A. 2 giờ 48 phút.
- B. 1 giờ 59 phút.
- C. 3 giờ 57 phút.
- D. 1 giờ 24 phút.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng. Trong chuyển động tròn đều

- A. vectơ vận tốc luôn không đổi, do đó gia tốc bằng 0.
- B. gia tốc hướng tâm hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương tốc độ.
- C. phương, chiều độ lớn của vận tốc luôn thay đổi.
- D. gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỷ lệ với bình phương tốc độ góc.

Câu 23: Một vật đang chuyển động theo đường tròn đều dưới tác dụng của lực hướng tâm F . Nếu tăng bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với lúc trước và đồng thời giảm tốc độ còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm

- A. giảm 8 lần.
- B. giảm 4 lần.
- C. giảm 2 lần.
- D. Không thay đổi.

Câu 24: Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ **không** có tính đàn hồi?

- A. Sắt
- B. Đồng.
- C. Nhôm.
- D. Đất sét.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

- A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
- B. Trong giới hạn đàn hồi, khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn.
- C. Lực đàn hồi có chiều cùng với chiều của lực gây biến dạng.
- D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với chiều của lực gây biến dạng.

Câu 26: Một người tập yoga. Tư thế thứ nhất là đứng hai chân trên sàn, tư thế thứ hai là đứng một chân trên sàn, tư thế thứ ba là nằm trên sàn. Sự so sánh nào sau đây về áp lực và áp suất của người đó trong ba tư thế trên là đúng?

- A. $F_1 = F_2 = F_3$ và $p_1 = p_2 = p_3$.
- B. $F_1 = F_2 = F_3$ và $p_2 > p_1 > p_3$.
- C. $F_1 = F_2 = F_3$ và $p_1 > p_2 > p_3$.
- D. $F_2 > F_1 > F_3$ và $p_2 > p_1 > p_3$.

Câu 27: Một vật có khối lượng 200 g được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là 20 cm . Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài 18 cm . Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Độ cứng của lò xo này là

- A. 200 N/m . B. 150 N/m . C. 100 N/m . D. 50 N/m .

Câu 28: Người ta treo một đầu lò xo vào một điểm cố định, và móc vào đầu dưới của lò xo những quả nặng, mỗi quả đều có trọng lượng 2 N . Khi chùm quả nặng có 2 quả thì chiều dài lò xo là 10 cm . Khi chùm quả nặng có 5 quả thì chiều dài lò xo là 15 cm . Chiều dài tự nhiên và hệ số đàn hồi của lò xo là:

- A. $12,5\text{ cm}$; $53,4\text{ N/m}$ B. $5,0\text{ cm}$; 80 N/m
C. $5,0\text{ cm}$; 200 N/m D. $6,7\text{ cm}$; 120 N/m

Phần 2: Tự luận (3 điểm)

Câu 1: Hai vật A và B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với $R_1 = 3R_2$, nhưng có cùng chu kì. Nếu vật A chuyển động với tốc độ bằng 15 m/s , thì tốc độ của vật B là bao nhiêu?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 2: Một lò xo có đầu trên gắn cố định. Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 23 cm . Nếu treo vật nặng khối lượng 800 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 24 cm . Biết khi treo cả hai vật vào một đầu của lò xo thì lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính độ cứng của lò xo.

.....
.....
.....
.....
.....
.....