

ĐỀ THI HỌC KÌ II:**ĐỀ SỐ 2****MÔN: TOÁN - LỚP 7****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****LỜI GIẢI CHI TIẾT****I. Trắc nghiệm**

1.C	2.B	3. A	4.A	5.A	6. C
7.B	8.C	9.B	10.D	11.A	12.C

Câu 1.**Phương pháp**

Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

Cách giải:

Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng $\frac{k}{4}$

Chọn C.**Câu 2.****Phương pháp**

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải

$$\text{Vì } 7x = 4y \text{ nên } \frac{x}{4} = \frac{y}{7}$$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{y-x}{7-4} = \frac{24}{3} = 8$$

Do đó $x = 4 \cdot 8 = 32$; $y = 7 \cdot 8 = 56$.

Chọn B.

Câu 3.**Phương pháp**

Đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì $y = kx$

Lời giải

Khi $x = -3$ thì $y = kx = 2 \cdot (-3) = -6$

Chọn A.**Câu 4.****Phương pháp**

Tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch: tích 2 giá trị tương ứng của 2 đại lượng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)

Cách giải:

Hệ số tỉ lệ là: $-12 \cdot 8 = -96$.

Khi $x = 3$ thì $y = -96 : 3 = -32$.

Chọn A**Câu 5.****Phương pháp****Áp dụng:**

Định lí Tổng định lí 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ.

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Cách giải:

Gọi số đo 3 góc của tam giác lần lượt là a, b, c .

Vì tổng 3 góc trong một tam giác là 180 độ nên $a + b + c = 180^\circ$.

Do số đo ba góc tỉ lệ với $3:4:5$ nên $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}$.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5} = \frac{a+b+c}{3+4+5} = \frac{180}{12} = 15$$

$$\Rightarrow a = 15 \cdot 3 = 45;$$

$$b = 15 \cdot 4 = 60;$$

$$c = 15 \cdot 5 = 75.$$

Chọn A.

Câu 6

Phương pháp

Hệ số tự do của đa thức thu gọn là hệ số của hạng tử không chứa biến trong đa thức.

Cách giải:

$M = -8x^2 - 4x + 3 - 2x^5$ có hệ số tự do là 3.

Chọn C

Câu 7.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } P(x) - G(x) &= (6x^3 - 3x^2 - 2x + 4) - (5x^2 - 7x + 9) \\ &= 6x^3 - 3x^2 - 2x + 4 - 5x^2 + 7x - 9 \\ &= 6x^3 + (-3x^2 - 5x^2) + (-2x + 7x) + (4 - 9) \\ &= 6x^3 - 8x^2 + 5x - 5. \end{aligned}$$

Vậy $P(x) - G(x) = 6x^3 - 8x^2 + 5x - 5$.

Chọn B.

Câu 8.

Phương pháp

Thay lần lượt các giá trị của x vào đa thức.

Khi $x = a$, đa thức có giá trị bằng 0 thì a là nghiệm của đa thức.

Lời giải

+) Thay $x = 1$ vào đa thức $5x^2 - 3x - 2$, ta có:

$$5 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 - 2 = 0$$

Do đó, $x = 1$ là nghiệm của đa thức $5x^2 - 3x - 2$.

+) Thay $x = -1$ vào đa thức $5x^2 - 3x - 2$, ta có:

$$5 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-1) - 2 = 5 + 3 - 2 = 6$$

Do đó, $x = -1$ không là nghiệm của đa thức $5x^2 - 3x - 2$.

+) Thay $x = \frac{2}{5}$ vào đa thức $5x^2 - 3x - 2$, ta có:

$$5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 - 3 \cdot \frac{2}{5} - 2 = 5 \cdot \frac{4}{25} - \frac{6}{5} - 2 = \frac{4}{5} - \frac{6}{5} - 2 = \frac{-12}{5}$$

Do đó, $x = \frac{2}{5}$ không là nghiệm của đa thức $5x^2 - 3x - 2$.

Thay $x = \frac{-2}{5}$ vào đa thức $5x^2 - 3x - 2$, ta có:

$$5 \cdot \left(\frac{-2}{5}\right)^2 - 3 \cdot \frac{-2}{5} - 2 = 0$$

Do đó, $x = \frac{-2}{5}$ là nghiệm của đa thức $5x^2 - 3x - 2$.

Vậy $x = 1$ và $x = \frac{-2}{5}$ là hai nghiệm của đa thức $5x^2 - 3x - 2$.


Chọn C.

Câu 9.

Phương pháp: Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác, tính góc M.

Dựa vào quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác.

Cách giải:



Xét tam giác MNP có: $M + N + P = 180^\circ$ (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

$$\Rightarrow M = 180^\circ - N - P = 180^\circ - 70^\circ - 55^\circ = 55^\circ$$

Ta được: $M = P$

Mà cạnh NP là cạnh đối của góc M, MN là cạnh đối của góc P.

Vậy $NP = MN$.

Chọn B.

Câu 10:**Phương pháp:**

Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền – góc nhọn, từ đó suy ra cặp cạnh tương ứng bằng nhau.

Cách giải:

Xét ΔBAD và ΔBHD có:

$$\angle BAD = \angle BHD = 90^\circ$$


BD chung

$$\angle ABD = \angle HBD \text{ (vì } BD \text{ là tia phân giác } \angle B\text{)}$$

$\Rightarrow \Delta ABD = \Delta HBD$ (cạnh huyền – góc nhọn)

$\Rightarrow BA = BH$ (hai cạnh tương ứng).

Chọn D.

**Câu 11.**

Phương pháp: Bất đẳng thức tam giác: Kiểm tra tổng độ dài 2 cạnh nhỏ hơn có lớn hơn độ dài cạnh lớn nhất không. Nếu không thì bộ 3 độ dài đó không tạo được thành tam giác.

Cách giải:


Vì $18 + 10 = 28$ nên không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác.

Do đó, bộ ba độ dài đoạn thẳng 18 cm; 28 cm; 10 cm không thể tạo thành một tam giác.

Chọn A.

Câu 12.**Phương pháp**

Vẽ hình và nhận xét A là giao điểm của hai đường thẳng nào? Hai đường thẳng ấy có quan hệ như thế nào với tam giác ABC.

Cách giải:

Vì $AB \perp AC$ nên AB , AC là hai đường cao. Suy ra A là giao điểm của hai đường cao. Vậy A là trực tâm tam giác ABC.

Đáp số: A là trực tâm tam giác ABC.

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)**Câu 1****Phương pháp:**

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là x, y (cm) (điều kiện: $x, y > 0$)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Cách giải:

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là x, y (cm) (điều kiện: $x, y > 0$)

Theo đề bài: chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt tỉ lệ với $5 : 3$ nên ta có: $\frac{x}{5} = \frac{y}{3}$

Hai lần chiều dài hơn ba lần chiều rộng là 8 cm nên $2x - 3y = 8$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{x}{5} = \frac{y}{3} = \frac{2x}{10} = \frac{3y}{9} = \frac{2x - 3y}{10 - 9} = \frac{8}{1}$

Khi đó, $\frac{x}{5} = 8 \Rightarrow x = 40$ (tmđk)

$\frac{y}{3} = 8 \Rightarrow y = 24$ (tmđk)

Chu vi của hình chữ nhật là: $2(x + y) = 2(40 + 24) = 128$ (cm)

Bài 2.

+ Ta có thể mở rộng cộng (trừ) các đa thức dựa trên quy tắc “dấu ngoặc” và tính chất của các phép toán trên số.

+ Đối với đa thức một biến đã sắp xếp còn có thể cộng (trừ) bằng cách đặt tính theo cột dọc tương tự cộng (trừ) các số.

+ $x = a$ được gọi là nghiệm của $P(x)$ nếu: $P(a) = 0$

+ Với các đa thức bậc cao, ta thường biến đổi để đưa về tích của các đơn thức rồi tìm nghiệm.

+ $A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0$ hoặc $B = 0$.

Cách giải:

$$M(x) = 2 - 5x^2 + 3x^4 - 4x^2 + 3x + x^4 - 4x^6 - 7x$$

$$N(x) = -1 + 5x^6 - 6x^2 - 5 - 9x^6 + 4x^4 - 3x^2$$

a) Ta có:

$$\begin{aligned} M(x) &= 2 - 5x^2 + 3x^4 - 4x^2 + 3x + x^4 - 4x^6 - 7x \\ &= -4x^6 + (3x^4 + x^4) + (-5x^2 - 4x^2) + (3x - 7x) + 2 \\ &= -4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 4x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= -1 + 5x^6 - 6x^2 - 5 - 9x^6 + 4x^4 - 3x^2 \\
 &= (5x^6 - 9x^6) + 4x^4 + (-6x^2 - 3x^2) + (-1 - 5) \\
 &= -4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 6
 \end{aligned}$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned}
 H(x) &= M(x) + N(x) \\
 &= (-4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 4x + 2) + (-4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 6) \\
 &= (-4x^6 - 4x^6) + (4x^4 + 4x^4) + (-9x^2 - 9x^2) - 4x + (2 - 6) \\
 &= -8x^6 + 8x^4 - 18x^2 - 4x - 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G(x) &= M(x) - N(x) \\
 &= (-4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 4x + 2) - (-4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 6) \\
 &= -4x^6 + 4x^4 - 9x^2 - 4x + 2 + 4x^6 - 4x^4 + 9x^2 + 6 \\
 &= (-4x^6 + 4x^6) + (4x^4 - 4x^4) + (-9x^2 + 9x^2) - 4x + (2 + 6) \\
 &= -4x + 8
 \end{aligned}$$

c) $G(x) = 0 \Rightarrow -4x + 8 = 0 \Rightarrow -4x = -8 \Rightarrow x = 2.$

Bài 3.

Phương pháp:

- + Sử dụng các cách chứng minh hai tam giác bằng nhau.
- + Sử dụng tính chất của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.
- + Các định lí từ vuông góc tới song song.
- + Tính chất các đường cao, đường phân giác, đường trung trực trong tam giác cân.

Cách giải:

a) Xét hai tam giác vuông ΔABD và ΔEBD có:

- + BD chung
- + $\angle ABD = \angle EBD$ (vì BD là tia phân giác của $\angle ABC$)
- $\Rightarrow \Delta ABD = \Delta EBD$ (cạnh huyền – góc nhọn) (đpcm)

b) Vì $\begin{cases} AH \perp BC(gt) \\ DE \perp BC(gt) \end{cases} \Rightarrow AH // DE$ (từ vuông góc đến song song)


$\Rightarrow AID = IDE$ (2 góc so le trong) (1)

Vì $\Delta ABD = \Delta EBD$ (câu a) nên $ADB = BDE$ (2 góc tương ứng)

hay $ADI = IDE$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow AID = ADI$. Do đó ΔAID cân tại A . (đpcm)

c) Vì $AH // DE$ (cmt) nên $HAE = AED$ (2 góc so le trong) (3)



Vì $\Delta ABD = \Delta EBD$ (câu a) nên $AD = DE$ (2 cạnh tương ứng) $\Rightarrow \Delta ADE$ cân tại D.

$$\Rightarrow DAE = DEA \text{ (2 góc tương ứng)} \quad (4)$$

Từ (3) và (4) $\Rightarrow HAE = DAE \Rightarrow AE$ là tia phân giác của HAC (đpcm).

d) Vì ΔAID cân tại A $\Rightarrow AI = AD$, lại có $AD = DE$ (cmt) $\Rightarrow AI = DE$

Nếu $DC = 2AI \Rightarrow DC = 2DE$.

Gọi M là trung điểm DC $\Rightarrow DM = MC$. Xét tam giác vuông DEC có EM là đường trung tuyến $\Rightarrow EM = DM = MC$

$$\Rightarrow \Delta DEM \text{ là tam giác đều} \Rightarrow EDC = 60^\circ \text{ (tính chất tam giác đều).}$$

Xét tam giác DEC vuông tại E có $EDC = 60^\circ \Rightarrow DCE = 30^\circ$ hay $ACB = 30^\circ$.

Vậy để $DC = 2AI$ thì tam giác ABC có thêm điều kiện là $ACB = 30^\circ$.

Bài 4.

Phương pháp:

Xét với $x = -1$, ta tìm được mối liên hệ của $f(-1)$ và $f(1)$

Xét với $x = 1$, ta tìm được $f(1)$.

Cách giải:

+ Với $x = -1$, ta có: $f(-1) + (-1) \cdot f(1) = -1 + 1$

$$\Rightarrow f(-1) - f(1) = 0$$

$$\Rightarrow f(-1) = f(1)$$

+ Với $x = 1$, ta có: $f(1) + 1 \cdot f(-1) = 1 + 1$

$$\Rightarrow f(1) + f(-1) = 2$$

$$\text{Suy ra, } f(1) + f(1) = 2$$

$$\Rightarrow 2f(1) = 2$$

$$\Rightarrow f(1) = 1$$

$$\text{Vậy } f(1) = 1$$