

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 8**MÔN: SINH HỌC – LỚP 11****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM**
 **Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Sinh học.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học.
- Tích hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của giữa học kì I – chương trình Sinh học .

Đáp án và Lời giải chi tiết
Thực hiện bởi ban chuyên môn Loigiaihay

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án**Câu 1:** Loài động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua bề mặt cơ thể?

- A. Thủy tảo.
- B. Châu chấu.
- C. Cá chép.
- D. Rắn hổ mang.

Phương pháp:

Thủy tảo trao đổi khí với môi trường qua bề mặt cơ thể.

Cách giải:

Đáp án A.

Câu 2: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

- A. Trai sông.
- B. Chim bồ câu.
- C. Ốc sên.
- D. Châu chấu.

Phương pháp:

Chim bồ câu có hệ tuần hoàn kín.

Cách giải:

Đáp án B.

Câu 3: Hoocmôn nào sau đây có vai trò thúc quả chóng chín và rụng lá?

- A. Giberelin.
- B. Xitôkinin.
- C. Etilen.
- D. Florigen.

Phương pháp:

Etilen có vai trò thúc quả chóng chín và rụng lá.

Cách giải:

Đáp án C.

Câu 4: Trong hệ dẫn truyền tim, bộ phận nào sau đây có khả năng tự phát xung thần kinh?

- A. Bó His.
- B. Mạng Puôckin.
- C. Nút nhĩ thất.
- D. Nút xoang nhĩ.

Phương pháp:

Trong hệ dẫn truyền tim, mạng Puockin có khả năng tự phát xung thần kinh.

Cách giải:

Đáp án B

Câu 5: Để kích thích sự ra rẽ ở cành giâm, cành chiết người ta sử dụng hoocmôn nào sau đây?

- A. Auxin.
- B. Etilen.
- C. Axit abxixic.
- D. Giberelin.

Phương pháp:

Để kích thích sự ra rẽ ở cành giâm, cành chiết người ta sử dụng hô môn giberelin.

Cách giải:

Đáp án D.

Câu 6: Những hoocmon nào sau đây kích thích sinh trưởng ở thực vật?

- A. Auxin, axit abxixic, xitôkinin.
- B. Auxin, giberelin, etilen.
- C. Auxin, etilen, axit abxixic.
- D. Auxin, gibêrelin, xitôkinin.

Phương pháp:

Auxin, gibêrelin, xitôkinin kích thích sinh trưởng ở thực vật.

Cách giải:

Đáp án D.

Câu 7: Hoocmôn sinh trưởng ở người do tuyến nội tiết nào tiết ra?

- A. Tuyến yên.
- B. Tuyến giáp.
- C. Tuyến sinh dục.
- D. Tuyến tụy.

Phương pháp:

Hoocmôn sinh trưởng ở người do tuyến yên tiết ra.

Cách giải:

Đáp án A.

Câu 8: Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là:

- A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
- B. Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
- C. Mô phân sinh bên có ở thân, rẽ của cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở măt của thân cây một lá mầm.
- D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

Phương pháp:

Mô phân sinh bên có ở thân, rễ của cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở mặt của thân cây một lá mầm.

Cách giải:

Đáp án C

Câu 9: Trong xinap hoá học, thành phần nào sau đây có chứa thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học?

- A. Chùy xinap.
- B. Khe xinap.
- C. Màng sau xinap.
- D. Màng trước xinap.

Phương pháp:

Trong xinap hoá học, màng sau xinap có chứa thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

Cách giải:

Đáp án C

II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Khi nói về hô hấp và tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?

- I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.
- II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O₂ và máu giàu CO₂.
- III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O₂ hơn máu trong tĩnh mạch.
- IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

Phương pháp:

Lý thuyết hô hấp và tuần hoàn ở động vật.

Cách giải:

- I. Sai
- II. Sai
- III. Sai
- IV. Đúng

Câu 2: Các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật được dùng trong nông nghiệp là gì?

Chọn phương pháp đúng.

- I. Chiết, ghép.
- II. Giâm.
- III. Nuôi cây mô tế bào.
- IV. Nhân bản vô tính.

Phương pháp:

Lý thuyết các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật

Cách giải:

- I. Đúng
- II. Sai
- III. Sai
- IV. Sai

III. Câu trả lời ngắn

Câu 1: Ở gà, thiểu hoocmôn nào từ nhỏ khi lớn lên gà trống sẽ có mào nhỏ, không biết gáy, không có cựa, mất bản năng sinh dục.

Phương pháp:

Lý thuyết sinh trưởng và sinh sản ở động vật

Cách giải:

Testosterone.

Câu 2: Những từ còn nào còn thiếu trong câu sau:..... và là những quá trình liên quan với nhau, là hai mặt của chu trình sống của cây.

Phương pháp:

Lý thuyết sinh trưởng và phát triển của thực vật.

Cách giải:

Sinh trưởng, phát triển.

Câu 3: Từ nào còn thiếu trong câu sau: Ra hoa là giai đoạn.....chuyển từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh sản.

Phương pháp:

Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.

Cách giải:

Quan trọng.