

**ĐỀ THI HỌC KÌ I – Đề số 4****Môn: Toán học - Lớp 10****Bộ sách Chân trời sáng tạo****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết học kì I của chương trình sách giáo khoa Toán 10 – Chân trời sáng tạo.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận Toán học.
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương học kì I – chương trình Toán 10.

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT****THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****I. Trắc nghiệm (6 điểm)**

1.C	2.C	3.D	4.D	5.A	6.B	7.C	8.C	9.B	10.C
11.A	12.C	13.C	14.C	15.C	16.A	17.D	18.A	19.D	20.A
21.D	22.C	23.B	24.B	25.D	26.B	27.B	28.D	29.B	30.D

**Câu 1 (TH):****Cách giải:** $P(3)$ : là mệnh đề sai. $P(4)$ : là mệnh đề sai. $P(1)$ : là mệnh đề sai. $P(5)$ : là mệnh đề đúng.**Chọn D.****Câu 2 (TH):****Phương pháp:**Phủ định của  $\forall$  là  $\exists$ , phủ định của  $<$  là  $\geq$ **Cách giải:**Phủ định của  $\forall x \in R, x^2 - x + 7 < 0$  là  $\exists x \in R, x^2 - x + 7 \geq 0$ .**Chọn A.**

**Câu 3 (NB):****Phương pháp:**

$$X \subset Y \Leftrightarrow \forall x \in X \Rightarrow x \in Y$$

**Cách giải:**

Ta có  $A \subset X$  nên  $X$  có ít nhất 3 phần tử  $\{1; 2; 3\}$ .

Ta có  $X \subset B$  nên  $X$  phải có nhiều nhất 5 phần tử và các phần tử thuộc  $X$  cũng thuộc  $B$ .

Do đó các tập  $X$  thỏa mãn là có 4 tập thỏa mãn.

**Chọn A.**

**Câu 4 (TH):****Phương pháp:**

Giải phương trình  $(x^2 - x - 6)(x^2 - 5) = 0$  và lấy các nghiệm hữu tỉ.

**Cách giải:**

$$\text{Ta có } (x^2 - x - 6)(x^2 - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 6 = 0 \\ x^2 - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \in \mathbb{Q} \\ x = -2 \in \mathbb{Q} \\ x = \sqrt{5} \notin \mathbb{Q} \\ x = -\sqrt{5} \notin \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Do đó  $X = \{-2; 3\}$ .

**Chọn C.**

**Câu 5 (TH):****Phương pháp:**

Áp dụng định nghĩa tìm các phép toán trên tập hợp.

**Cách giải:**

$$\text{Ta có } \begin{cases} A \setminus B = \{0; 1\} \\ B \setminus A = \{5; 6\} \end{cases} \Rightarrow (A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

**Chọn D.**

**Câu 6 (TH): -****Phương pháp:**

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và áp dụng định nghĩa các phép toán trên tập hợp.

**Cách giải:**

$$[-7; 3] \setminus [-4; 0] = [-7; -4) \cup (0; 3]$$

**Chọn B.****Câu 7 (NB):****Phương pháp:**

Thay tọa độ các điểm vào bất phương trình và kiểm tra tính đúng sai.

**Cách giải:**

$$\text{Ta có } 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) - y + 3 \Leftrightarrow -x + 3y - 1 > 0.$$

Vì  $-2 + 3 \cdot 1 - 1 > 0$  là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ  $B$ .**Chọn C.****Câu 8 (TH):****Phương pháp:**

Thay tọa độ các điểm vào bất phương trình và kiểm tra tính đúng sai

**Cách giải:**

Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình.

$$\text{Với } M(0;1) \Rightarrow \begin{cases} 0 + 3 \cdot 1 - 2 \geq 0 \\ 2 \cdot 0 + 1 + 1 \leq 0 \end{cases}. \text{ Bất phương trình thứ hai sai nên A sai.}$$

$$\text{Với } N(-1;1) \Rightarrow \begin{cases} -1 + 3 \cdot 1 - 2 \geq 0 \\ 2 \cdot (-1) + 1 + 1 \leq 0 \end{cases} : \text{Đúng.}$$

**Chọn B.****Câu 9 (NB):****Phương pháp:**

Một là giá trị có tần số lớn nhất trong mẫu.

**Cách giải:**Tiền thưởng 4 triệu đồng được thưởng cho 15 người  $\Rightarrow M_0 = 4$ **Chọn A.****Câu 10 (TH):****Phương pháp:**Tần suất  $f_i$  của giá trị  $x_i$  là tỉ số giữa tần số  $n$  và kích thước mẫu  $N$  có công thức  $f_i = \frac{n}{N}$ .**Cách giải:**

$$\text{Tần suất } f = \frac{10}{380} = \frac{1}{38} \approx 2,63\%$$

**Chọn A.****Câu 11 (TH):**

**Phương pháp:**

$$\text{Số trung bình là } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

**Cách giải:**

Tiền thưởng trung bình:

$$\bar{x} = \frac{5.2 + 15.3 + 10.4 + 6.5 + 4.6}{40}$$

$$\bar{x} = 3,725 \text{ (triệu đồng)}$$

**Chọn A.****Câu 12 (TH):****Phương pháp:**

Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là một

**Cách giải:****Chọn C.****Câu 13 (TH):****Phương pháp:**

Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành 1 dãy không giảm (không tăng).

Bước 2:

+ Nếu số phần tử lẻ thì  $M_e$  là số đứng giữa dãy.

+ Nếu số phần tử chẵn thì  $M_e$  là trung bình cộng của 2 số đứng giữa dãy.

**Cách giải:**

Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành một dãy không giảm là:

1      4      4      6      7      9      10

Vậy số trung vị là  $M_e = 6$

**Chọn B.****Câu 14 (TH):****Phương pháp:**

Dùng MTCT để tính

**Cách giải:**

+ Điểm trung bình của 100 học sinh là:  $\bar{x} = 15,09$

+ Độ lệch chuẩn:

$$S = \sqrt{\frac{1}{100} \left[ 2 \cdot (9 - 15,09)^2 + 1 \cdot (10 - 15,09)^2 + \dots + 3 \cdot (19 - 15,09)^2 \right]}$$

$$S \approx 2,17$$

**Chọn D.**

**Câu 15 (NB):**

**Phương pháp:**

Hàm phân thức xác định khi mẫu thức khác 0.

**Cách giải:**

$$\text{Hàm số xác định khi và chỉ khi } x^2 + 3x - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq -4 \end{cases}$$

Vậy TXĐ của hàm số là  $D = \mathbb{R} \setminus \{1; -4\}$ .

**Chọn B.**

**Câu 16 (TH):**

**Phương pháp:**

Căn bậc 2 xác định khi biểu thức trong căn không âm.

**Cách giải:**

$$\text{ĐKXD: } \begin{cases} 6 - 3x \geq 0 \\ x + 2 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq -2 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

Vậy TXĐ của hàm số là  $D = [-2; 2] \setminus \{0\}$ .

**Chọn C.**

**Câu 17 (TH):**

**Cách giải:**

TXĐ:  $D = \mathbb{R}$ . Với mọi  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  và  $x_1 < x_2$ , ta có

$$f(x_1) - f(x_2) = (4 - 3x_1) - (4 - 3x_2) = -3(x_1 - x_2) > 0.$$

Suy ra  $f(x_1) > f(x_2)$ . Do đó, hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

Mà  $\left(\frac{4}{3}; +\infty\right) \subset \mathbb{R}$  nên hàm số cũng nghịch biến trên  $\left(\frac{4}{3}; +\infty\right)$ .

**Chọn B.**

**Câu 18 (TH):**

**Phương pháp:**

Thay tọa độ các điểm ở các đáp án vào hàm số. Điểm nào thỏa mãn hàm số thì sẽ thuộc đồ thị hàm số.

**Cách giải:**

Thay  $x=2$  vào hàm số ta được:  $y = \frac{\sqrt{2-2} - 2}{2-6} = \frac{-2}{-4} = 0,5$  nên điểm  $(2; 0,5)$  thuộc đồ thị hàm số.

**Chọn C.**

**Câu 19 (VD):**

**Phương pháp:**

Phân tích biểu thức về dạng có hằng đẳng thức

**Cách giải:**

$$D = [3; +\infty)$$

$$y = x - 2\sqrt{x-3} = (x-3 - 2\sqrt{x-3} + 1) + 2 = (\sqrt{x-3} - 1)^2 + 2 \geq 2 \text{ khi } x = 4.$$

**Chọn D.**

**Câu 20 (NB):**

**Phương pháp:**

Cho hàm số bậc hai  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị  $(P)$ , đỉnh của  $(P)$  là  $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

**Cách giải:**

$$\text{Toạ độ đỉnh của parabol } y = -2x^2 - 4x + 6 \text{ là } \begin{cases} x = -\frac{-4}{2 \cdot (-2)} = -1 \\ y = -2 \cdot (-1)^2 - 4 \cdot (-1) + 6 = 8 \end{cases} \Rightarrow I(-1; 8).$$

**Chọn A.**

**Câu 21 (NB):**

**Phương pháp:**

Dùng bảng các giá trị lượng giác đặc biệt.

**Cách giải:**

Tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt, ta được

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}; \sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$$

**Chọn A.**

**Chọn D.**

**Câu 22 (NB):**

**Phương pháp:**

Dùng định lý cosin  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$

**Cách giải:**

Theo định lí hàm sin, ta có  $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Leftrightarrow \frac{5}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 60^\circ} \Rightarrow AC = \frac{5\sqrt{6}}{2}$


**Chọn A.**

**Câu 23 (TH):**

**Phương pháp:**

Dùng định lí cosin  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

**Cách giải:**



Theo định lí hàm cosin, ta có:  $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{4^2 + 6^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{1}{2}$

Do  $MC = 2MB \Rightarrow BM = \frac{1}{3}BC = 2$

Theo định lí hàm cosin, ta có

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos B$$

$$= 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

$$\Rightarrow AM = 2\sqrt{3}$$

**Chọn C.**

**Câu 24 (TH):**

**Phương pháp:**

Tính  $\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B)$ .

Sử dụng định lí sin:  $\frac{c}{\sin C} = 2R$ .

**Cách giải:**

Ta có:  $\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B) = 60^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có:  $\frac{c}{\sin C} = 2R \Rightarrow R = \frac{c}{2 \sin C} = \frac{6}{2 \sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$ .


**Chọn B.**

**Câu 25 (TH):**

**Phương pháp:**

Áp dụng quy tắc cộng vectơ, quy tắc hình bình hành để biểu diễn vectơ.

**Cách giải:**



$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3} \cdot \left( \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

Mặt khác,  $\overrightarrow{BA} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$  nên ta có:  $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

Vậy  $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ .

**Chọn A.**

**Câu 26 (TH):**

**Phương pháp:**

Dùng quy tắc cộng, trừ hai vectơ

**Cách giải:**

Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

Đáp án B. Ta có  $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$   
 $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

Đáp án C. Ta có  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$ .

Đáp án D. Ta có  $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{PM} = -\overrightarrow{MP}$ .



**Chọn D.**

**Câu 27 (VD):**

**Phương pháp:**

Dùng quy tắc cộng, trừ hai vectơ

**Cách giải:**

Ta có  $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$ .

**Chọn B.**

**Câu 28 (VD):**


**Phương pháp:**

Nếu M là trung điểm của AB thì với mọi điểm O là luôn có  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$

**Cách giải:**

Gọi M là trung điểm BC  $\Rightarrow AM \perp BC$ .

Trong tam giác vuông AMB, ta có  $AM = AB \cdot \sin \angle ABM = a \cdot \sin 30^\circ = \frac{a}{2}$ .



Ta có  $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |2\overrightarrow{AM}| = 2AM = a$ .

**Chọn B.**

**Câu 29:**

**Phương pháp:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

**Cách giải:**

Ta có  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \angle BAC = 45^\circ$  nên  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 45^\circ = a \cdot a \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$

**Chọn A.**

**Câu 30 (TH):**

**Phương pháp:**

**Cách giải:**

Ta có  $|\overline{AB} - \overline{DA}| = |\overline{AB} + \overline{AD}| = |\overline{AC}| = AC = a\sqrt{2}$ .

**Chọn C.**

**II. Tự luận (4 điểm)**

**Câu 1 (VD):**

**Phương pháp:**

Dùng các phép toán trên tập hợp

**Cách giải:**

Gọi tập hợp các học sinh thích môn Toán là A. Khi đó  $n(A)=20$

Gọi tập hợp các học sinh thích môn Anh là B. Khi đó  $n(B)=18$

Số học sinh học thích môn Toán hoặc thích môn Anh là  $n(A \cup B)$  là  $40 - 12 = 28$  học sinh

Vậy số học sinh thích môn cả 2 môn Toán, Anh là  $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 20 + 18 - 28 = 10$

Vậy có tất cả 10 học sinh vừa thích môn Toán vừa thích môn Anh.

**Câu 2 (VD):**

**Phương pháp:**

a) Hàm số  $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$  có trục đối xứng  $x = -\frac{b}{2a}$ .

b) Sự biến thiên

$a > 0$		
$x$	$-\infty$	$+\infty$
	$-\frac{b}{2a}$	
$y$	$+\infty$	$+\infty$
	$-\frac{b^2 - 4ac}{4a}$	

$a < 0$		
$x$	$-\infty$	$+\infty$
	$-\frac{b}{2a}$	
$y$	$+\infty$	$+\infty$
	$-\frac{b^2 - 4ac}{4a}$	

\* Vẽ đồ thị

+ Đỉnh I  $\left(-\frac{b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$

+ Trục đối xứng  $x = -\frac{b}{2a}$

+ Giao với các trục (nếu có)

+ Lấy các điểm thuộc đồ thị (đối xứng nhau qua trục đối xứng).

**Cách giải:**

a. Hàm số (P):  $y = 2x^2 + bx + c$ , có  $a = 2$

Ta có  $M(0;4) \in (P)$  suy ra  $4 = 2.0^2 + b.0 + c \Leftrightarrow c = 4$

Mà (P) có trục đối xứng  $x = 1$ . Do đó  $-\frac{b}{2a} = 1 \Leftrightarrow b = -2a = -2.2 = -4$

Vậy hàm số có dạng  $y = 2x^2 - 4x + 4$

b.  $y = 2x^2 - 4x + 4$

Đỉnh S có tọa độ  $x = -\frac{-4}{2.2} = 1, y = 2.1^2 - 4.1 + 4 = 2$

Vì hàm số có  $a = 2 > 0$  nên ta có bảng biến thiên

$x$	$-\infty$	1	$+\infty$
$y$	$+\infty$	2	$+\infty$

Vậy hàm số đồng biến trên  $(1; +\infty)$ , nghịch biến trên  $(-\infty; 1)$ .

\* Đồ thị:

Trong mặt phẳng Oxy đồ thị của  $y = 2x^2 - 4x + 4$  là parabol (P) có:


Đỉnh I (1;2)

Trục đối xứng là  $x = 1$

Bề lõm quay lên trên

Cắt trục tung tại điểm A(0,4)

Lấy điểm B(2;4) đối xứng với A qua trục đối xứng.




**Câu 3 (TH):**

**Phương pháp:**

Áp dụng định lí sin.

**Cách giải:**

Gọi D là đỉnh tháp, C là điểm chính giữa của chân tháp. Khi đó chiều cao của tháp là CD.



Ta có:  $CAD = 63^\circ, CBD = 48^\circ \Rightarrow DAB = 180^\circ - CAD = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$

Xét tam giác DAB ta có:  $AB = 100, \hat{A} = 117^\circ, \hat{B} = 48^\circ \Rightarrow ADB = 180^\circ - 117^\circ - 48^\circ = 15^\circ$

Áp dụng định lí sin ta được:  $\frac{AB}{\sin ADB} = \frac{DB}{\sin DAB} \Leftrightarrow \frac{100}{\sin 15^\circ} = \frac{DB}{\sin 117^\circ}$

$$\Rightarrow DB = \sin 117^\circ \cdot \frac{100}{\sin 15^\circ}$$

Lại có:  $\triangle DCB$  vuông tại C, suy ra  $CD = DB \cdot \sin B$

$$\Leftrightarrow CD = \sin 117^\circ \cdot \frac{100}{\sin 15^\circ} \cdot \sin 48^\circ \approx 256$$

Vậy tháp đó cao khoảng 256m.

**Câu 4 (VD):**

**Phương pháp:**

Nếu M là trung điểm của AB thì với mọi điểm O ta luôn có  $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}$

**Cách giải:**

a) Ta có:  $\vec{AK} = \frac{1}{2}(\vec{AM} + \vec{AN})$  (vì K là trung điểm của MN)

Mà M là trung điểm AB, suy ra  $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$

$$\text{Lại có: } NA = \frac{1}{2}NC \Rightarrow AN = \frac{1}{3}AC \Rightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{b) Ta có: } \overrightarrow{KD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC}) \text{ (do D là trung điểm BC)}$$

$$= \frac{1}{2}(\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{KA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AK} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$= -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \text{ (đpcm)}$$